

TARJETA DE INFORMACIÓN DE ABACAVIR/LAMIVUDINA TARBIS PARA EL PACIENTE

CARA 1

IMPORTANTE - TARJETA DE INFORMACIÓN DE
Abacavir/Lamivudina Tarbis 600 mg/300 mg comprimidos recubiertos con película EFG
PARA EL PACIENTE
(abacavir/lamivudina)
Lleve siempre esta tarjeta consigo

Dado que Abacavir/Lamivudina Tarbis contiene abacavir, los pacientes en tratamiento con Abacavir/Lamivudina Tarbis pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad (reacción alérgica grave) que **puede representar un riesgo para la vida** si el tratamiento con Abacavir/Lamivudina Tarbis continúa. **PÓNGASE EN CONTACTO CON SU MÉDICO**

INMEDIATAMENTE para que le aconseje si debe, o no, interrumpir el tratamiento con Abacavir/Lamivudina Tarbis si:

- 1) **tiene una erupción cutánea O**
- 2) **tiene uno o más de los síntomas incluidos en al menos DOS de los siguientes grupos**
 - fiebre
 - dificultad respiratoria, dolor de garganta o tos
 - náuseas o vómitos o diarrea o dolor abdominal
 - cansancio excesivo o dolores o malestar general.

Si ha interrumpido el tratamiento con Abacavir/Lamivudina Tarbis debido a esta reacción, **JAMÁS VUELVA A TOMAR** Abacavir/Lamivudina Tarbis o cualquier otro medicamento (ej. abacavir, dolutegravir/abacavir/lamivudina o abacavir/lamivudina/zidovudina) que contenga abacavir ya que, **en cuestión de horas**, puede experimentar una bajada de tensión arterial que puede representar un riesgo para su vida u ocasionarle la muerte.

(ver dorso)

CARA 2

Deberá ponerse inmediatamente en contacto con su médico, si cree que está experimentando una reacción de hipersensibilidad a Abacavir/Lamivudina Tarbis. Escriba a continuación el nombre y el teléfono de su médico:

Doctor:.....

Tel:

Si su médico no puede atenderle, deberá solicitar urgentemente asistencia médica alternativa (por ejemplo en el servicio de urgencias del hospital más cercano).

Para más información relativa a aspectos generales de Abacavir/Lamivudina Tarbis, póngase en contacto con

Tarbis Farma, S.L.

Email: +